

Y ahora que estoy vacunado... ¿qué me está pasando?

Marta Pérez Álvarez, Marina Guisado Clavero, Ana María Herrero Gil, Sara Ares Blanco

Ámbito del caso

Atención Primaria y Atención de Urgencias

Motivo de consulta

Historia clínica

Lesiones pruriginosas generalizadas

- Varón, 86 años, vacunado contra la COVID 19 con una segunda dosis de Pfizer hace 3 semanas. Niega nuevos tratamientos desde la vacunación.

- Acude a consulta por lesiones pruriginosas en espalda, tórax y raíz de ambos miembros de 10 días de evolución, que no responden a tratamiento con corticoide tópico.

- A la exploración presenta lesiones papulosas de 1 cm y placas pseudodiana de aproximadamente 2- 3 cm en tronco, espalda y abdomen inferior.

Se realiza Punch de la lesión con resultado: DERMATITIS ESPONGIÓTICA Y LEVE INFILTRADO PERIVASCULAR SUPERFICIAL CON EOSINÓFILOS SUGESTIVO DE TOXICODERMIA

- Se trata con Prednisona oral con buena evolución.



Juicio clínico

TOXICODERMIA secundaria a vacunación Pfizer por Covid-19

Conclusiones y aplicabilidad

- La toxicodermia hace referencia a un amplio espectro de lesiones cutáneas inducidas por medicamentos
- La forma más frecuente es el exantema morbiliforme: **erupción brusca generalizada, bilateral y simétrica, rojo-violácea**, que suele producir prurito.
- Cualquier fármaco puede producir una reacción adversa a nivel de cutáneo. Los más frecuentes son los antiinflamatorios y los antibióticos.
- Suele aparecer entre 1- 10 días después de haber recibido el fármaco implicado, aunque el periodo de latencia es variable.

Como **conclusión** debemos tener en cuenta la importancia de la **anamnesis** en consulta, tanto como la exploración. La evolución cronológica de las lesiones, la determinación de factores predisponentes y de agentes externos que puedan relacionarse con la aparición de lesiones son de gran importancia para realizar una primera aproximación diagnóstica.