

PARASITOSIS OCASIONADA POR EL CALZADO

Autores: Miriam Gómez Carracedo¹, Renata Muñoz Bieber²

Centro de trabajo: C.S Buenos Aires

Antecedentes personales



No alergias medicamentosas conocidas
Fibromialgia

Motivo de consulta



Mujer de 63 años acude a consulta por dolor y prurito interdigital del pie derecho de varios días de evolución

Exploración física



Lesión edematosa-eritematosa interdigital, dolorosa a la palpación



Impresión diagnóstica y manejo



Sospecha diagnóstica inicial:

Heloma interdigital / ojo de gallo

Plan:

Separador interdigital y acudir al podólogo

Evolución



Finalmente tras acudir al podólogo la paciente es diagnosticada de **MIASIS FORUNCULOIDE** (parasitosis), en probable relación con calzado, infectado con huevos de la larva.



CONCLUSIONES

La **MIASIS FORUNCULOIDE** consiste en la infestación de tejidos y cavidades corporales por larvas de insectos.

La larva penetra y forma un saco en la dermis profunda o hipodermis, comunicándose al exterior a través de un pequeño canal

Clínicamente se manifiesta como pápulas eritematosas que en ocasiones se ulceran y adquieren aspecto de forúnculo o gran pústula con un orificio central (poro respiratorio de la larva). El tejido circundante se palpa indurado y eritematoso debido al gran infiltrado inflamatorio

Localizaciones mas frecuentes son pies, nalgas y genitales externos por el contacto con ropa y calzado.

El **diagnóstico** es clínico , basado en los antecedentes, sintomatología y características de la lesión.

El **tratamiento** consiste en la extracción de la larva a través del orificio respiratorio

PALABRAS CLAVE: parasitosis, calzado, heloma