

Ecografiando a un **RIÑÓN MUY TÍMIDO**

Ignacio Martín Torres*, Jorge Bueno Uceda, Ángela Gallego Arenas

* Contacto: imartint@salud.madrid.org

Nuestra paciente



- Dolor en hipocondrio derecho.
- Irradiación genital ipsilateral.
- Vómitos, disuria y polaquiuria.
- Masa hipogástrica dolorosa.

Primeras pruebas

- Hematuria moderada –
- Cristaluria (oxalato) –
- Fracaso renal agudo –



Riñón derecho de localización ectópica (posterior al lóbulo hepático izquierdo), malrotado y con ambos polos libres, junto a los siguientes hallazgos adicionales:

- Dilatación tanto del seno renal como de los cálices renales, con integridad del parénquima renal
- Imagen redondeada con refuerzo acústico posterior, contenido anecoico y contornos lisos bien definidos




Hidronefrosis
grado 3



Quiste renal tipo
Bosniak 1

¿Qué hemos aprendido de este caso?

- 1) La ectopia renal es una anomalía embrionaria por un ascenso deficiente.
- 2) Hay que describir la localización renal y la presencia de malrotación asociada.
- 3) Se deben valorar bien los polos renales, ya que la ectopia puede asociarse a defectos de fusión como el riñón en herradura.
- 4) Dados los hallazgos sugestivos de cólico complicado se debe solicitar una valoración urgente por Urología.



(en este caso, tras 24 h de Observación, le dieron el alta con seguimiento en consultas)