



DOCTORA, ME DUELE TODO Y ES POR LA VACUNA DEL COVID

*Autores: Marta Bentanachs González, Ángela Revilla Laguna, Esther Gómez Suárez
*Centro de trabajo: Centro De Salud Universitario El Greco. Getafe, Madrid.

MOTIVO CONSULTA Y ANTECEDENTES:

Margarita es una mujer de 82 años con antecedentes de DM 2, HTA y dislipemia. En tratamiento con sitagliptina 50 mg, insulina abasaglar, simvastatina 20 mg y enalapril/hidroclorotiazida 20mg/12'5mg. Consulta por dolores generalizados de dos semanas de evolución, localizados principalmente en miembros superiores y caderas, que limitan su actividad diaria (dificultad para ponerse de pie o peinarse); lo relaciona con administración de tercera dosis de vacuna COVID (Pfizer). No otros síntomas.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

A la exploración física destaca rigidez y dolor a nivel proximal de miembros superiores e inferiores con limitación de la movilidad e imposibilidad para levantar brazos por encima de la cabeza; no signos de artritis, no dolor o induración en arterias temporales. Resto sin hallazgos. Se realiza analítica sanguínea ante persistencia de clínica a pesar de analgesia de primer y segundo escalón con PCR 74.8, VSG:75 y leve leucocitosis con neutrofilia.

Ante sospecha de primer episodio de polimialgia reumática se inicia tratamiento con deflazacort 12 mg/día con franca mejoría de los síntomas con valoración posterior por reumatología que confirma diagnóstico.

DIAGNÓSTICO:

Polimialgia reumática

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- Artrosis
- Mieloma múltiple
- Artritis reumatoide
- Espondiloartropatías
- Fibromialgia
- Depresión

CONCLUSIÓN:

Ante un primer episodio de polimialgia reumática es necesario tener en cuenta los posibles desencadenantes, en este caso como posible efecto secundario de la vacuna Pfizer en los que cada vez se tiene más experiencia y existe más literatura.

PALABRAS CLAVE:

Polimialgiareumática, COVID-19, efecto secundario