



LESIONES CUTÁNEAS EN RELACIÓN CON ESCABIOSIS

*Autores: Blanca Bach Álvarez , Verónica Rizzo Vinuesa , David Morena López, Daniel Arias Ramírez.

*Centro de trabajo: Hospital Fundación Jiménez Díaz

MOTIVO CONSULTA Y ANTECEDENTES

Paciente varón de 23 años sin alergias medicamentosas conocidas y sin otros antecedentes de interés que acude al servicio de urgencias presentando prurito generalizado y lesiones cutáneas tras contacto con otro individuo infectado de sarna.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A la exploración física el paciente se encuentra con buen estado general, estable hemodinámicamente, eupneico, afebril, normohidratado y normocoloreado.

En la piel se evidencia un rash puntiforme de distribución uniforme que no respeta palmas, plantas y no desaparece a la digitopresión.

Es muy útil para el diagnóstico detectar el surco acarino confirmando la sospecha.

Como pruebas complementarias se solicitaron serologías para ETS que fueron negativas.



Es posible aislar el ácaro o sus huevos desde la piel infectada, sin embargo se recomienda recurrir a ello solo en caso de duda diagnóstica.

DIAGNÓSTICO

Lesiones cutáneas compatibles con infección por escabiosis tras contacto con individuo confirmado sin factores de alarma ni afectación sistémica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Infección por Sarna o Escabiosis
- Dermatitis de contacto o herpetiforme
- Eccema atópico
- Pediculosis
- Sífilis secundaria

CONCLUSIÓN

La sarna es un trastorno de la piel causado por pequeños ácaros o aradores de la sarna llamados "Sarcoptes scabiei". Es una infección contagiosa y el contagio se produce rápidamente por el contacto físico cercano, por ello la importancia de detectarla a tiempo ya que el médico puede ayudar a determinar la causa exacta y debe asegurarse de que el paciente reciba el tratamiento adecuado y esté informado de las medidas necesarias para prevenir una nueva infestación y evitar el contagio.

El tratamiento pautado fue Permetrina 5% en crema explicando la manera de aplicarla y Cetirizina 10mg 1 comprimido cada 6h.

PALABRAS CLAVE: Escabiosis, Prurito, Ácaro.