



# CONVULSIONES EN EL ANCIANO

“Para diagnosticar una enfermedad hay que haber pensado en ella”

Díez Rodríguez, M; Escribano Romo, G; Zaldo Motala, S

Varón 86 años  
Parkinson  
Deterioro cognitivo leve  
IAVB con supervisión  
Camina con andador

Cita programada en  
Primaria por deterioro  
físico (hiporexia y  
nerviosismo)  
3 visitas a hospital:  
hipocalcemia leve, ITU  
con RAO

En el CS:  
Crisis convulsiva con  
movimientos  
involuntarios de  
extremidades, aumento  
de rigidez y pérdida de  
conocimiento


Cede con  
diazepam 5mg  
IV

En el hospital:  
TAC craneal  
Analítica  
EEG

CRISIS PARCIAL  
SECUNDARIAMENTE  
GENERALIZADA  
**EPILEPSIA vs SÍNCOPE**

Lamotrigina 25mg  
1cp/12h

## ETIOLOGIA DE LAS CONVULSIONES



## CARACTERISTICAS DIFERENCIALES de la EPILEPSIA en el ANCIANO

Incidencia en aumento

Prevalencia más alta por grupo de edad

70% inicio focal

30% estatus epiléptico

Periodo proscritico más prolongado

Tratamiento condicionado por efectos secundarios y pluripatología