

# FIEBRE INTERMITENTE DE DOS AÑOS DE EVOLUCIÓN

\*Autores: M.<sup>a</sup> Teresa Rollan L. Clara Pérez U.  
CS Las Rozas El Abajón

## DESCRIPCIÓN DEL CASO

Acude a la consulta un varón de 52 años por presentar desde hace dos años, episodios autolimitados de escalofríos, distermia, tos, sibilancias y artromialgias de horas de duración, que suelen coincidir con la vuelta a casa desde el trabajo.

## PRUEBAS COMPLEMENTARIAS desde AP:

ANALÍTICA

Sin hallazgos

RX TÓRAX

Normal

CULTIVO ESPUTO

No se aíslan microorganismos

ESPIROMETRÍA

Normal

FVC 4.460 (98%) FEV1 3.630  
(99%) FEV1/FVC% 81.40

Se deriva a Neumología para completar estudio:

**BRONCOSCOPIA:** predominio linfocítico con incremento de CD4 en el lavado broncoalveolar.

**TC TÓRAX:** discreto engrosamiento las paredes bronquiales sin otros hallazgos

## DIAGNÓSTICO

Tras estos hallazgos el cuadro es sugestivo de **NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD** aguda tras exposición a polvo tóner y maquinaria de imprenta en entorno laboral.

## DISCUSIÓN

La **neumonitis por hipersensibilidad** es una enfermedad pulmonar intersticial difusa de causa conocida, ocasionada por la inhalación de polvos orgánicos. El antígeno causal desencadena una reacción inmunológica anormal que ocasiona un infiltrado linfocitario alveolointersticial y una neumonitis granulomatosa. El tratamiento se basa en la interrupción del contacto con el agente etiológico.