

ADMINISTRACIÓN DE FUROSEMIDA MEDIANTE PICC EN INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA

Impacto en la Calidad de Vida y Abordaje Domiciliario

Monclús González, Olga; Bravo Prados, Miriam; López Núñez, Ana. ESAPD Goya, Madrid

Caso y Paciente

Paciente: Varón de 85 años con ICAv refractaria a tratamiento oral.

Clínica: Disnea de mínimos esfuerzos, ortopnea severa y edemas.


Antecedentes: Ingresos recurrentes y dificultad para accesos periféricos.

Criterio de elección: Rechazo al hospital, priorizando manejo de síntomas en domicilio.

Abordaje: Cuidados Paliativos y Atención Primaria.

Intervención: PICC

Insertión de catéter PICC ecoguiado para acceso venoso central fiable.



Pauta: Perfusión continua de furosemida IV en domicilio con ajuste de dosis y monitorización de función renal e iones.

★ Resultados Clínicos

- ✓ Mejoría notable de disnea y ortopnea.
- ✓ Resolución de edemas y peso.
- ✓ Recuperación funcional relevante.
- ✓ Cero ingresos hospitalarios.

CONCLUSIÓN

El PICC domiciliario es una estrategia eficaz y segura que mejora el bienestar y evita ingresos en el paciente con ICAv.

Menos Hospital, más Vida

C. verbal

