

ARTRALGIAS MIGRATORIAS COMO DEBUT DE SÍFILIS SECUNDARIA

Nº Comunicación: 052



RSNI
SOMaMFyC



ANAMNESIS Y MOTIVO DE CONSULTA

♂ 34 años sin antecedentes de interés, comienza a acudir al CS de forma frecuente.

Situación basal: IABVD. Casado con hombre desde hace 10 años, niega otras parejas sexuales en este tiempo.

Motivos de consulta:

- Odinofagia (cede con analgesia)
- Omalgia y dolor costal izquierdo (sin lesión aparente, cede con analgesia)
- Epitrocleítis (cede con AINES)
- Dolor tibial bilateral alternante.
- Otagia sin OMA, se deriva a ORL → OTOTUBARITIS, pautan cefuroxima con aparición de EXANTEMA.
- Sudoración nocturna

EXPLORACIÓN FÍSICA

- ACP: Rítmico. MVC.
- Exantema eritematoso anular en cuello y tronco no pruriginoso.
- Adenopatías laterocervicales y axilares.
- Genitales sin hallazgos.

PPCC Y DIAGNÓSTICO

Serología: RPR POSITIVO 1/32.
Anticuerpos IgG y IgM positivos.
TPPA POSITIVO.

SÍFILIS SECUNDARIA

CONCLUSIÓN

Debe considerarse la Sífilis en el diagnóstico diferencial de pacientes jóvenes con artralgias sin desencadenante, a pesar de que nieguen relaciones sexuales de riesgo.