



Nº Comunicación:070

## SIGNOS INEQUÍVOCOS DE FRACTURA-LUXACIÓN

Autores: GM Saiz Ladera, ME Pejenaute Labari, M González Godoy

HHH  
SOMaMFyC



**Palabras clave:** mano, fractura, luxación.

**Antecedentes médicos:** Mujer. 73 años. AP: HTA. Dislipemia. Artrosis. SAOS.

**Motivo de consulta:** caída fortuita y dolor en 1º dedo de mano derecha.

### Exploración física (osteoarticular y neurovascular):

**Deformidad** IFD 1º dedo

**Dolor**

**Inflamación**

**Limitación funcional** para flexo-extensión 1º dedo

No dolor en tabaquera anatómica

No pérdida de fuerza y sensibilidad en mano

Pulso radial palpable

### P. Complementarias: Rx:

Fractura-luxación falange distal 1º dedo



### Conclusiones:

- **Son signos sospechosos de fractura-luxación la presencia de dolor, deformidad, tumefacción.**
- Las fracturas simples, estables y cerradas que no presentan desplazamiento, se pueden resolver desde atención primaria.
- La atención de fracturas, subluxaciones o luxaciones requiere inmovilización, y para ello previamente hay que descartar lesiones de partes blandas (nervios, tendones o pérdida cutánea).