



Una úlcera pediátrica de riesgo

Nº Comunicación:076

Autoras: Lucía Sánchez Llanos, Carmen Mateo Pascual, Blanca Nieto Gómez.
Ámbito del caso: Centro de Salud Fuencarral


Motivo de consulta y Descripción del caso



Lesión dolorosa en piel

Paciente adolescente de 15 años que acude a consulta por presentar una lesión dolorosa y ulcerada en región interglútea, a 2 cm del ano, de 1 mes de evolución. Niega secreciones vaginales y refiere mantener relaciones de riesgo. Afebril. Sin otra clínica en la anamnesis por aparatos.

Exploración física y Pruebas Complementarias



Úlcera interglútea a 2cm del ano
Adenopatía inguinal dolorosa



IGG + *Treponema Pallidum*
RPR - TPHA +
Año anterior serologías -



2,4 MU
Penicilina G



Enf. infecciosas
pediátricas

Diagnóstico diferencial

VHS1/2 **VS** Sífilis primaria

Diagnóstico

Sífilis Primaria

Conclusiones

- ✓ ETS en DD de lesiones dermatológicas independientemente de la edad
- ✓ Importancia anamnesis enfoque y diagnóstico en estadios tempranos
- ✓ Prevención de conductas de riesgo y fomentar buenos hábitos sexuales

Palabras clave

Sífilis, pediatría, úlcera