



CUANDO EL IMPLANTE SUBDÉRMICO ESTÁ FUERA DE LA PIEL

Historia clínica

Mujer de 28 años, sin antecedentes de interés y recientemente trasladada a España desde Reino Unido, que acude a consulta por **irritación mecánica** persistente y molestias en la cara interna del brazo izquierdo tras la inserción de un implante subdérmico de etonogestrel **hace dos meses**. Refiere que, tras la colocación por su médico de origen, manifestó dudas sobre la posición del dispositivo, **aunque se le aseguró que era correcta**.



Implante correctamente colocado. Todo el implante debe quedar debajo de la piel. Se sitúa a 8-10 cm del epicóndilo del húmero y 3-5 cm por debajo del surco del bíceps-triceps



Implante erróneamente colocado, lo que compromete la eficacia anticonceptiva

Exploración física

El **extremo distal** de la varilla (aproximadamente 0,5 cm) **protruye** a través de la piel. El orificio de entrada se encuentra cicatrizado y no existen signos de infección.



Conclusión

Este caso subraya la **importancia de la seguridad de la paciente y del principio de 'no hacer'**. No se deben realizar procedimientos sin la formación o experiencia necesarias para ello. Y si se comete algún error, el **bienestar y la seguridad de la mujer deben prevalecer siempre** sobre cualquier otra consideración técnica o económica.