

El puzzle clínico: de la cetoacidosis a la meningitis

Nº Comunicación: 101

Anabel Viton (1), Alejandra Zabala (2), Cristina Angulo (2)

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Espinillo. Madrid Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Orcasitas. Madrid



Palabras Claves: Meningoencefalitis, Infección por el Virus de la Varicela-Zóster, Cetoacidosis Diabética

Mujer, 89 años, AP de HTA, DM, AIT en 2018 y Valvulopatia con NACOS.Presenta paresia de hemicuerpo derecho, sin responder a estímulos verbales, sin emisión de lenguaje, con desviación oculocefálica izquierda, sin poder precisar hora de inicio de la clínica. EF: T° 38°C; Glasgow 10/15;. glucemia capilar de 479 mg/dl. Se activa "código ictus" con TC craneal: pequeño foco hiperdenso cortico subcortical en giro temporal superior izquierdo, posible relación con hematoma intraparenquimatoso lobar agudo. Se objetiva lesiones vesiculosas en región posterior de hemitórax izquierdo (dermatoma T9). Analitica: acidosis metabólica, elevación de reactantes de fase aguda (PCR 0.81 mg/dl, y leucocitosis 7.3 x1000/µl, EEG Normal. Punción Lumbar con meningitis vírica, PCR positiva (VVZ). Rx tórax: infiltrado en LII compatible con neumonía broncoaspirativa.

En resumen, paciente con cuadro de meningitis vírica por virus varicela zóster, neumonía broncoaspirativa y cetoacidosis diabética, manejo inicial con perfusión de insulina y cobertura empírica con aciclovir, ceftriaxona y ampicilina que posteriormente se escala a moxifloxacino. Pese al tratamiento médico, la paciente presenta deterioro neurológico y respiratorio progresivos por lo que se consensua limitación del esfuerzo terapéutico.



<u>Conclusiones</u> Importancia del diagnóstico diferencial ante cuadro neurológico en paciente diabético, debiendo indagar más allá de la cetoacidosis diabética. Realizar exploración física completa, incluyendo dermatológica. Consensuar la limitación del esfuerzo terapéutico en paciente con deterioro progresivo a pesar de tratamiento médico, con pronóstico desfavorable, priorizando medidas de confort.